



社会医療法人友愛会
豊見城中央病院



社会医療法人友愛会
友愛医療センター

※2020年8月1日より豊見城中央病院は「友愛医療センター」へ移転・名称変更します。

糖尿病・生活習慣病センター
(内分泌代謝科専門)
研修医説明資料

○ 糖尿病・生活習慣病センター



常勤医6名、非常勤医5名（日本糖尿病学会認定専門医9名）

（日本内分泌学会認定専門医6名）

日本看護協会認定糖尿病認定看護師1名、専任看護師3名

糖尿病療養指導士5名、栄養士若干名、運動療養指導士2名

メディカルアシスタント3名

各内科専門研修施設の内科13領域の研修の可能性

	総合内科	消化器	循環器	内分泌	代謝	腎臓	呼吸器	血液	神経	アレルギー	膠原病	感染症	救急
豊見城中央病院	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○
民間A病院	○	○	○	△	△	△	○	○	△	○	△	△	○
国公立A病院	○	○	△	△	△	×	○	×	○	○	△	○	×
民間B病院	○	○	○	△	△	○	○	△	△	△	△	○	△
民間C病院	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	△	○	○
民間D病院	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○
国公立B病院	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
国公立C病院	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
国公立D病院	○	△	△	×	△	△	△	×	△	×	△	△	○
南部病院	○	△	○	○	○	○	○	△	○	△	△	○	○

沖縄県における各研修施設での内科13領域における診療経験の研修可能性を3段階(○、△、×)の評価しました。
 (○:研修できる、△:時に経験できる、×:ほとんど経験できない)

① 研修目標

- ① 糖尿病専門医と内分泌専門医の両方を取得する。
- ② 学会発表や論文作成を積極的に経験する。
- ③ チーム医療を実践する。



副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍について

100180 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 平成29年度

手術情報	患者数及び割合			平均在院日数	
頭蓋内腫瘍摘出術等	4	0.0%		18.5	
副腎悪性腫瘍手術等	388	2.4%		13.5	
腹腔鏡下副腎摘出術等	1,995	12.1%		10.8	
その他手術あり	888	5.4%		19.7	
手術なし	13,182	80.1%		6.2	
計	16,457	100.0%		7.6	

○ 当院の患者数

全国18位（平成29年度）

九州では 2位



病院名	患者数	日数
東京女子医科大学病院	330	5.0
独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院	202	7.8
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会 横浜市東部病院	180	4.2
独立行政法人国立病院機構京都医療センター	167	4.7
武蔵野赤十字病院	165	3.2
東京医科歯科大学医学部附属病院	154	5.2
東北大学病院	146	10.2
九州大学病院	146	10.9
国立大学法人 千葉大学医学部附属病院	144	7.5
大阪大学医学部附属病院	131	8.0
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	130	5.8
独立行政法人国立病院機構 九州医療センター	129	5.2
自治医科大学附属病院	125	6.3
兵庫医科大学病院	125	9.6
市立札幌病院	118	4.1
神戸大学医学部附属病院	116	9.7
公立大学法人福島県立医科大学附属病院	115	6.6
社会医療法人友愛会 豊見城中央病院	113	4.8
大阪市立総合医療センター	104	6.1
広島大学病院	103	5.6

糖尿病・生活習慣病センターの特徴

- ①糖尿病、内分泌・代謝の症例を十分に経験できる。
- ②指導医は、学会発表や論文作成をサポートできる。
- ③チーム医療が経験できる。
- ④希望に応じて、研究や留学を積極的に支援する。
- ⑤治験や臨床研究を経験できる。

医学書院
Journal of
Generalist
Medicine

ジェネラルに診ることが求められる時代の臨床誌

4
2019
Vol.29
No.4

総合診療

“ナゾ”の痛み 診療ストラテジー

OPQRSTで読み解く

■片岡仁美

急に頸部が激しく痛い
原病患者で頭が痛い
胸が痛いし皮膚も出ます
ずっと「心臓神経症」と言われてきました
急にお腹が痛くなり、慢性腰痛に
検査では何も出ないけど腰が痛い
脳出血の後より手足に痛みが
血糖は良くなったけれど足が痛い！
注射後の長引く痛み
痛みで日常生活が一般
全部イタイ
痛みと疲労で動けない
関節が痛いです！
腰も足も痛いです！

【総論】
痛み治療の新しい視点
慢性痛のサイエンス

【各論】
診断と治療のストラテジー
「頸の先から足の先まで」
痛みのcase file14

【スペシャル・アーティクル】
慢性疼痛の集学的治療
実際・課題・今後の展望

【コラム】
鎮痛薬の副作用

出典：総合診療2019年4月号(医学書院)

オール沖縄！
カンファレンス Ver. 2.0

レジデントの対応と指導医の考え

豊見城中央病院
盛島菜美・眞境名豊文・比嘉盛丈＝著
徳田安春＝監修

第⑩回
ちょっと待った、その骨折！

CASE

患者：22歳、男性。
主訴：左股関節痛。
現病歴：受診約10日前、フットサル中に徐々に左股関節痛が出現した。その時は引きずって歩ける程度の痛みであり、翌日に近医整形外科を受診したがX線検査では原因を特定できず、後日MRIでの精密検査の予定となっていた。受診日の朝、自宅の庭で岩に足をとられて転倒し、その後より左股関節痛が増強して歩行困難となったため、当院へ救急搬送された。
既往歴：出生時の異常指摘なし。生後3カ月の頃に敗血症での入院歴あり。小学生～中学生の時に手指の骨折、計3回。
生活歴：大学生。機会飲酒、喫煙なし。
内服歴：定期的服薬はなし。

骨は未発達で、二次性徴は欠如していた(図1)。
下肢：左股関節に明らかな腫脹・変形はなかったが、痛みが強く、自動・他動ともに不可能であり、特に股関節内旋が強く制限されていた。

来院時検査所見

血算：WBC 14,900/ μ L、RBC 429 $\times 10^3$ / μ L、Hb 12.2 g/dL、Ht 43.2%、MCV 85.5 fL、Pit 24.2 $\times 10^3$ / μ L。
生化学：Na 141 mEq/L、K 3.8 mEq/L、Cl 104 mEq/L、Ca 9.8 mg/dL、IP 4.9 mg/dL、BUN 15 mg/dL、Cr 0.50 mg/dL、AST 17 IU/L、ALT 15 IU/L、ALP 500 IU/L、 γ GTP 11 IU/L、CRP 0.24 mg/dL。
股関節 CT：図2

進路

希望に応じて、基礎研究や他県留学等を支援する。

沖縄県は他県と同様に、糖尿病、内分泌・代謝の専門医が不足しており、就職先探しには困らない。

友愛会には、当院、南部病院、健康管理センターが併設しており、色々な働き方がアレンジできる。

希望する医療圏で働けるように積極的に支援する。
(県や民間の中核病院にも就職の支援をする)

2019年6月現在



社会医療法人 友愛会
豊見城中央病院

TEL:098-850-3811

FAX:098-850-3810



友愛医療センター

※2020年8月1日移転・名称変更

※TEL/FAXは変更なし

糖尿病・生活習慣病センター

無断転用を禁止します。

本資料は2019年当院初期研修医向け資料より抜粋しています。